

应用氟康唑滴眼液须注意:(1)滴眼的次数要频繁,因滴眼后消除半衰期为 15~30 min,只有频繁滴眼,才能减少泪液稀释而降低的药物浓度,维持房水中药物有效的抗菌活性。(2)清理角膜溃疡面时,彻底去除病变区的坏死组织,有利于药物在组织的渗透,可明显提高疗效。

对于药物治疗 2 周以上,病情无改善或溃疡继续扩大、加深者,应尽快选择结膜瓣遮盖术,以免影响预后。结膜瓣遮盖术具有花费少、可反复进行、无角膜移植术的排斥反应等优点。本组仅有 2 例发生结膜瓣穿孔撕脱,成功率较高。应注意的是,清创要彻底,结膜瓣分离要完整,分离时勿带筋膜,以免影响创面愈合。

真菌性角膜溃疡常因地理环境及经济状况影响,

农村发病率明显高于城市,由于病情复杂,早期易误诊而出现并发症。早期准确的诊断和积极有效的治疗,可明显提高治愈率和保存视功能。这就强调了角膜刮片与培养的重要性,尤其是抗生素治疗无效者,要多次刮片以便确诊。尽管给予积极的全身及局部抗真菌治疗,仍有部分严重感染病例不能得到控制^[2]。本组中有 2 例最终角膜穿孔,其中 1 例摘除眼球。

参 考 文 献

[1] 晋秀明,赵云娥,瞿佳. 实验性真菌性角膜炎的研究进展[J]. 国外医学·眼科学分册,2004,28(2):80-83.

[2] 傅振和,陈颖,陈遐. 57 例真菌性角膜炎的药物治疗临床分析[J]. 中国实用眼科杂志,2004,22(3):221.

(编校:陈卓 收稿:2006-12-07)

· 短篇与个案 ·

安宫牛黄丸结合中药煎剂 治疗脑卒中后遗症 3 例

453000 河南新乡市 市中医院 邹世光 刘志群 何静

关键词:脑卒中后遗症;安宫牛黄丸
中国图书分类号:R 28;R 743.3

1 病例报告

例 1 男性,68 岁,右侧肢体偏瘫及双目视物不清,经检查确诊为“多发性脑梗死,双视网膜中央动脉阻塞”。中西医结合治疗 3 个月余,仍双目视物模糊,仅有光感,其余症状好转,遂至我院就诊。诊见:双目失明,痰黏稠色黄,面赤咽干,尿黄,大便干结,舌暗红,边有紫斑,苔黄厚腻,脉弦滑数。给予黄连温胆汤加味化裁:胆南星 10 g,黄连 10 g,半夏 10 g,橘红 15 g,石菖蒲 10 g,郁金 10 g,竹茹 15 g,桃仁 10 g,红花 10 g,水蛭 10 g,川贝 10 g,草决明 15 g,菊花 15 g,1 付/天,水煎服。早晚各服安宫牛黄丸 1 丸。10 天后视力开始恢复。继续治疗 1 个月,左眼视力 0.2,右眼视力 0.3。

例 2 女性,58 岁,因脑出血致失语 4 个月余就诊。诊见:失语不言,头晕胀痛,腹胀便秘,痰黄黏、量多,烦躁失眠,面赤口臭,舌暗红,苔黄厚腻,脉弦滑而大。给予投星萎承气汤加味:胆南星 10 g,瓜蒌 20 g,大黄 6 g,枳实 10 g,厚朴 10 g,草决明 15 g,石菖蒲 15 g,郁金 15 g,远志 15 g,浙贝 10 g,天麻 10 g,海蛤壳 15 g。1 付/天,水煎服。早晚各服安宫牛黄丸 1 丸。治疗 20 天后失语症明显好转,讲话基本正常。遂停服安宫牛黄丸,仍以星萎承气汤加减治疗 2 个月,症状消失。

例 3 女性,65 岁,因脑梗死合并心肌梗死后出现摇头及上肢震颤 6 个月就诊。诊见:头及上肢颤动,右下肢无力,胸闷隐痛,头晕目眩,气短乏力,咳黄色黏痰,腰膝酸痛,舌质暗红、有淤斑,苔黄腻,脉弦无力。给予导痰汤合龟鹿二仙汤化裁:胆南星 15 g,枳实 10 g,半夏 10 g,陈皮 10 g,茯苓 15 g,甘草 4 g,竹茹 20 g,石菖蒲 10 g,鹿角霜 15 g,龟板胶(烊化) 10 g,人参 6 g,枸杞 20 g,远志 10 g,水蛭 10 g,红花 10 g,僵蚕 15 g,地龙 15 g,全蝎(研冲)6 g,天麻 10 g,1 付/天,水煎服。早晚各服安宫牛黄丸 1 丸。治疗 1 个月后,震颤减轻,继续治疗 2 个月,震颤消失。

2 讨 论

安宫牛黄丸由清代名医吴鞠通所创,为温病“三宝”之一。方由牛黄、郁金、犀角、黄芩、黄连、朱砂、冰片、麝香等组成,有清热解毒、豁痰开窍之功,是治疗热邪内闭、神昏谵语之良药。我们用该药辅以中药煎剂治疗脑卒中后遗症,效果满意。

安宫牛黄丸常用于脑卒中的脏腑之阳闭证型。例 1 为脑梗死后遗失明症,患者虽无神昏表现,但其病机是痰热瘀塞脑髓窍道,目睛经络闭塞不通,故视物不清。黄连温胆汤可清化痰热,加活血类中药以化瘀通络,辅以安宫牛黄丸豁痰清热开窍,从而祛痰热、化瘀血、开窍道、养精血,达到视物清晰之目的。例 2 为脑出血后遗失语症,患者系脑卒中中脏腑后遗之症,昏迷虽解除,但其病机仍为痰热上壅清窍,下滞肠腑。故用安宫牛黄丸豁痰清热开窍,以治痰热上壅,加用星萎承气通下痰热,上下同治,则痰热、失语得愈。例 3 为脑梗死合并心肌梗死后遗震颤症。其病机为痰热挟风、上壅脑窍,兼有脾虚不运、肝肾亏虚。故用安宫牛黄丸豁痰清热、熄风开窍,并合导痰汤、龟鹿二仙汤化裁,以清化痰热、补肝肾、健脾胃、平肝风,标本兼治,从而使震颤得以痊愈。

(编校:范晨芳 收稿:2006-11-02)