

# 犀黄丸治疗非化脓性肋软骨炎 26 例疗效观察

江苏省南通市第一人民医院 中医科 孙刚  
骨科 姚健

非化脓性肋软骨炎又称泰齐 (Tietze) 氏病。其病理特征是胸骨旁肋软骨非化脓性疼痛性肿胀，局部可见轻微隆起，并有剧烈疼痛，咳嗽深呼吸以及病侧上肢活动时可使疼痛加剧，但局部皮肤绝无红肿，有效治疗时肿痛可止，但个别患者可因呼吸道感染而再发，并重现疼痛，缠绵难愈。早在六十年代国内即有运用中药治愈该病的个案报道<sup>(1)</sup>，近五年来笔者运用中成药犀黄丸治疗26例，疗效较好报告如下。

**一、一般资料：**本组26例，男9例，女17例。最小年龄22岁，最大年龄53岁。发病时间最短者两天，最长者近二年。发病部位全为一侧性，以累及2～3肋软骨为最多见。12例回顾在发病前一月内有明确的上呼吸道感染史。有12例曾服用过消炎痛，炎痛静等西药无明显效果。24例作白细胞及分类检查：除5例稍偏低外余均在正常范围。18例作胸部X线检查：一般无明显异常（7例肺纹理增粗，一例见陈旧性结核病灶）。本组患者之苔脉均无特殊。

**二、药物及使用方法：**临床所用之犀黄丸均为广州中药一厂生产。主要成份含量(%)：牛黄1.38、麝香1.88、乳香45.87、没药45.87。用法与用量：口服一次3～6克，一日一次。孕妇忌服。

**三、疗效标准与治疗效果：**本组病例以痛肿消失，1～2年未复发为痊愈；痛肿消失，一年内又有复发者（复用原药疗效仍好）为显效；用药后疼痛消失，肋软骨仍隆起者为有效。

本组26例均在服药后48小时内疼痛缓解，一周后大部分患者痛肿消失。痊愈18例、显效5例、有效3例，平均疗程0.5天，每人平均用药42克。

**四、病案举例：**夏××，男，53岁，干部。一周前有“上呼吸道感染”，自服“麦迪霉素”、“蛇胆川贝末”等中西药物后热退，咳嗽趋减。近三日来感觉左侧胸部疼痛，咳嗽及深呼吸时尤甚。查体：

~~~~~  
(上接第20页)

溃疡很好的佐证。约1/2～2/3的球后溃疡患者伴有球部溃疡，而球后溃疡好发于上曲部及降部上段，该部位无论X线检查或纤维胃镜观察都较困难，加上由于病变所致的管腔狭小等因素，故稍有疏忽，极易漏诊，我们认为在纤维胃镜检查时若已发现球部溃疡，

T 36.5℃、P 88次、R 16次、BP 140/80mmHg。心率88次/分、律齐，两肺呼吸音粗糙。左第三肋软骨与肋骨交界处隆起，其形如鸡卵，不红不热，推之不移，压痛明显，肝脾肋下未触及。实验室检查：白细胞6300，N 61%，L 39%。血沉3mm/h。X线胸部透视：两肺纹理增粗。予犀黄丸口服，一次3克，一日一次。五天后复诊痛已大减，肿亦消去十之七八，继服犀黄丸3天，痛肿全部消失，迄今已愈三年，未有复发。

**五、讨论与体会：**非化脓性肋软骨炎是较常见的胸部疾病，其发病原因尚待阐明<sup>(2)</sup>，本组26例中12例回顾有上呼吸道感染史，24例作白细胞总数及分类检查，均无增高（甚至部分偏低）。笔者认为该病似与病毒感染有一定关系。祖国医学认为该病是由于“气血失于流畅，气滞血瘀积聚而成”。其治疗原则以“理气止痛、活血化瘀为主”<sup>(3)</sup>。犀黄丸为清代医家王洪绪首创，具“清热解毒、化瘀散结止痛”之功效。原治乳岩、横痃、瘰疬、痰核、流注、肺痈等症，现常用于淋巴结炎、多发性脓肿、肺脓疡等疾患。运用犀黄丸治疗非化脓性肋软骨炎国内尚未有文献报道，该药疗效迅速，服用方便，与西药相比且无服用吲哚类药物而引起的不良反应，患者乐于接受。但犀黄丸货源较紧，价格较昂，目前还不宜普遍使用，在决定采用该药前应结合其病情，经济许可和其它有关因素作周密考虑以定取舍。

## 参 考 文 献

1. 殷悦武：中医杂志 1963; (12)
2. 尹贺龄主编：内科疾病鉴别诊断学 人民卫生出版社出版 1983:137
3. 顾伯华主编：中医外科临床手册 上海科学技 术出版社出版 1980:189

不应以此满足，应尽可能对上曲部及降部上段作详尽观察，特别是发现十二指肠上角及其周围有病变时更需注意。此外，对经过系统治疗的十二指肠球部溃疡患者，纤维胃镜检查时溃疡已愈合，但症状仍不减轻者，应想到可能伴发球后溃疡，注意密切观察球后部。

参考文献（略）