

南通蛇药内服外敷治疗带状疱疹 36 例

武警安徽省总队医院门诊部(230041) 何国兴

安徽医科大学 汪秀华

带状疱疹是皮肤科常见病,多发病,西医治疗较棘手,且疗效欠佳。笔者采用南通蛇药片内服外敷治疗本症 36 例,疗效显著。

36 例中,男性 24 例,女性 12 例;年龄 15~70 岁;病程 1~3d 者 15 例,4~7d 者 16 例,7d 以上者 5 例;发病部位在胸背部 13 例,腰腹部 11 例,额面部 3 例,四肢 6 例,外生殖器 1 例,臀部 2 例。

1 治疗方法

1.1 内服法:用南通蛇药片,每次服 10 片,每日三次,温开水送服。

1.2 外敷法:将南通蛇药片研碎成粉末状,用凉开水或 75% 酒精调成稀糊状,涂敷于皮肤患处部位,

外包油纸。用纱布或绷带包扎固定,每日外敷 5~6 次。

2 治疗结果

本组 36 例中显效 28 例,占 77.8%;有效 6 例,16.7%;总有效率为 94.5%。无效 2 例,占 5.5%。

3 讨论与体会

带状疱疹是水痘或疱疹病毒侵犯外胚层结构及感觉神经系统组织引起的。属祖国医学的缠腰火丹、火带疮、蛇丹、蛇串疮、蜘蛛疮等称谓。多由火邪湿毒蕴结皮肤而致病。笔者采用南通蛇药片内服配合外敷治疗,疗效显著,且使用方便,无毒副作用。

乌梅液外涂根治鸡眼

济南军区总医院(250031) 陈世彪

鸡眼是由于局部长期受压、摩擦和刺入异物等,使皮肤角质层增生并侵入真皮而形成,多见于足掌和趾侧,少数见于手指及掌面。笔者根据乌梅具有除死肌,去青黑痣,去恶肉的药性,研制了乌梅液外涂根治鸡眼,获得了满意的效果,现介绍如下供参考。

1 处方及制剂

乌梅 60g,食盐 20g,醋液 60ml。将乌梅用捣筒捣碎,然后和食盐、醋液共置于 200ml 的磨口瓶中,振摇,放置 48h,取其滤液备用。

2 用法

用热水浸泡鸡眼部位,用小刀除去表面角质层,用棉棒蘸乌梅液涂于鸡眼部位,待晾干后再涂 1~2 次,3~4 次/d,一周即可治愈。

3 疗效

外涂本药 3d,即可见鸡眼变性坏死,7d 逐渐自行退出脱落。用本品外涂根治鸡眼,经济安全,方便有效,不留疤痕及无任何副作用。

典型病例:陈某,右手掌大鱼际部,因刺入异物而长出鸡眼,直径 0.4cm,曾两次实施切除术,均因手术切除不彻底,在 3mo 后复发,后用本品外涂治疗 7d,鸡眼根除,至今已 3a 余未复发。

安宫牛黄丸治疗副睾炎验案二则

浙江省永康市中医院(321300) 胡军

安宫牛黄丸原为治疗湿热火入心包神昏惊厥要药,近年来引伸,治疗多种病症,笔者用以治疗副睾炎亦有良好效果,现报道如下:

胡某,男,41 岁,初诊于 1989 年 9 月 11 日。主诉一侧睾丸肿胀,剧烈疼痛,举步维艰,难于忍受。于 7d 前就诊于市人民医院泌尿外科,诊为急性副睾炎,先后用氨苄青、先锋霉素等抗菌药物无效,因来就诊,体检,阴囊肤色焮红,皮肤紧张光亮,触之有灼热感,左侧睾丸质地坚硬肿大如鸡卵,有明显压痛,

透光试验阴性,舌红绛苔黄腻,脉洪弦数。遂投以“安宫牛黄丸”内服,每服 1 丸,每日 2 次,服 1 丸后,疼痛锐减,行走方便,再服 3 天,睾丸肿胀消除。

应某,男,20 岁,初诊于 1992 年 6 月 23 日。一侧睾丸肿大坠痛如鸡卵,曾去市人民医院泌尿外科门诊,诊为副睾炎,投以多种抗生素,效不显,遂求诊于笔者,投以“安宫牛黄丸”,效立显。1994 年仲秋,缘于发怒,痛复发,仍服“安宫牛黄丸”而见效。