

疼痛感。阴户排出淡黄色或红色粘液。

治疗以调和冲任，活血祛瘀为治则。药用当归60克，黄柏、泽兰、瞿麦、车前各40克，香附子、红花、生栀子、丹皮各30克，益母草100克，蒲公英50克。

方义：当归、瞿麦、香附子、红花活血破瘀消肿，通经；黄柏润燥，补肾水之不足；生栀、车前子、公英、凉血分之热，解毒、消肿；泽兰、益母草、丹皮，调经血，消水肿，解毒，行血生新，泻血中郁热。诸药配合，疗效颇佳。

典型病例：楼观镇下三清村唐某养的4岁处处女母牛，营养中等，有发情，但长达两年久配不孕。遂用上方2剂，通过本交、受孕，现已产牛犊2头。又如司竹乡红丰村张某养的3.5岁红母牛，症状同上，服上方2剂，病愈，产牛犊2头。笔者用上述中药治疗19例，18例治愈产犊。

陕西周至县楼观镇畜牧兽医站 余畅儒

陕西周至县楼观镇三清兽医分站 余涛

中西医结合治疗小猪水肿病

仔猪水肿病，又称猪溶血性大肠杆菌病，是一种急性、散发性疾病。笔者从1984—1990年共治疗该病1500例，治愈1456例，治愈率为97%

方法：氯霉素或硫酸卡那霉素按每公斤体重用药25毫克肌注，每日2次，连用3天；5%葡萄糖溶液200毫升静脉注射，按猪病情需要和体型大小加减，每日2次，连用2天；内服中药：苍术15克，白术、酒芍、茯苓、枳壳各10克，官桂、桂枝、麻黄、广木香各6克，陈皮9克，甘草3克，煎水灌服，每日1剂，连服2天（此为30公斤体重猪的剂量）。

另用通关散（皂壳3克，雄黄、细辛、薄荷各1克，麝香少许共研末）少许吹鼻取嚏。针刺：山根、承浆、耳尖、太阳、睛灵、丹田、百会、尾根、尾尖等穴，每日1次，连用2天。

病例：1984年9月，梨梨梨乡李树生家饲养约15公斤小猪13头，食欲减少求诊。症见病猪头部、眼睑与颌下水肿，背部皮肤发光，眼睛清亮，体温正常，其中有2头稍大的猪除上述症状外，还表现为步态不稳，反应迟钝。诊为仔猪水肿病，即按上述方法治疗，全部治愈。

湖南长沙肉联厂劳服养殖场 李 著

安宫牛黄丸试治 幼犬脑炎2例

笔者使用安宫牛黄丸试治幼犬脑炎2例，现报导如下：

病例 1990年10月2日，五一乡兴隆村一头1月龄体重约2公斤营养中等的灰色幼犬患病求治。主诉：今天早晨发现不吃不喝，身上发热，走路时转圈，有时口吐白沫，抽搐，撒尿少。症见转圈式运动，步态不稳，共济失调，阵发性痉挛，口吐白沫。体温40.1℃，每分钟脉搏130次，呼吸26次。病情严重时呈现急速的转圈运动，时有鸣叫呻吟，尿失禁，食欲废绝。诊为脑炎。当即用青霉素、安痛定、硫酸镁等治疗2天，病状未见减轻，体温仍为40.2℃，且阵发性痉挛加重。10月4日，试用吉林市中药厂生产的安宫牛黄丸内服治疗。其用法：一丸安宫牛黄丸分为四份，每日早晚各服一份，连服2天；人用红霉素片1次2片，分早晚服2次，连服2天，治愈。20天后随访饮食量增加，体重增至2.5公斤，神经系统和运动系统正常，无后遗症。

吉林伊通满族自治县五一乡畜牧兽医站

张嘉儒
关玉珍

卡耳嵌药治疗猪热病

笔者在医疗猪病时常遇到一些用抗菌素治疗无效的热证病，采用卡耳嵌药治疗，多能收到满意效果，现介绍如下：

嵌药制备与用法：白砒10克，细辛、瓜蒌、皂角各25克，胡椒20克，共研极细末，装瓶密封备用。使用时在病猪耳背面中下部皮下，避开血管，用中宽针向下做一长1—2厘米的袋形创口，嵌入药末约0.05—0.1克，手指压住创口，轻轻按揉几次即可。一般在第二天嵌药部开始肿胀，第三天肿胀增大，局部发亮，病猪开始吃食，此时用大宽针划破肿胀部，使之流出黄水毒血，且在创口涂上桐油或醋。嵌药后，若局部肿势迅速，肿胀大，则病猪康复快，如不肿胀或肿势慢者无效。

病例：1988年4月某日，衡东县新塘区粮站食

（下转封四）