

莼肉12克、仙灵脾30克、仙茅12克、肉苁蓉30克、菟丝子30克、蜈蚣3条、牛膝30克。

服上方壹月后，双下肢较前有力，腰膝力增，可自行站立约3分钟，双手扶杖缓行约70米，两腿肤温渐复，大便略干，1—2日一次，大便时有主动排便感，小便如前。

原方继服六月余，患者病情明显好转，可自行站立约10分钟，腰膝力增，扶杖行走，能主动排便，不需使用甘油球，大便2天一次，仍保留导尿，双下肢肌力IV级，家属搀扶可上下楼，恢复工作。

讨论：

脊髓空洞症文献报告均认为其形成及发展是一个长期的、复杂的过程，但本例患者在发病半年内核磁共振发现脊髓空洞形成，作者认为是由于先进的核磁共振检查及早发现的结果，相信随着CT和核磁共振的广泛应用，对此病的发病过程将会有进一步的认识。从病史看本患者是由于感染所引起，由于感染所致的脊髓炎合并脊髓空洞症，国内文献报导极少。

以前脊髓空洞症被记载为慢性进行性变性病，并列为不治之症。近年来，虽然开展了外科治疗，但疗效很不理想。本例患者通过中药治疗，病情明显好转，说明中医中药治疗此病有明显的优势。

《临证指南医案·痿·邹滋九按》：

“夫痿证之旨，不外乎肝肾肺肾四经之病。盖肝主筋，肝伤则四肢不为人用，而筋骨拘挛。肾藏精，精血相生，精虚则不能灌溉诸末，血虚则不能营养筋骨。”肾开窍于二阴，司二便，肾气不固，膀胱失约，则二便失禁。

安宫牛黄丸灌肠治疗

中风病人53例临床报告

黑龙江中医学附属医院

于云凤 李秀梅 孙莹

松花江地区汽车修配厂卫生所 王晓华

我们运用安宫牛黄丸灌肠治疗中风昏迷病人53例，取得了满意疗效，现将结果报告如下：

临床资料：选用急性期入院病人53例中风伴昏迷病人，其中男性30例，女性23例，年龄在48—72岁。

治疗方法：选用安宫牛黄丸壹丸，加水20ml溶化，每6小时一次保留灌肠，适用于中风中脏腑型，伴有昏迷，躁动，高热病人7天为一疗程，显效后，改为每12小时，次保留灌肠。

治疗效果及疗效标准：显效：昏迷症状消失，神志清晰，体温降至正常。好转：昏迷程度减轻。结果显效36例占总例数86%

好转17例，占总例数32%，总有效率100%

典型病例

马××男53岁，病志号：31300

该患于1986年4月6日下午2时许，吃饭时突然口咽流涎，右半身不遂，随即失语，当时头痛，无恶心呕吐，次日入院，入院后，病人意识不清，牙关紧闭，肢体强痉，颜面红，呼吸气短，躁动不安。查体：意识朦胧，双眼向左共同偏视，双瞳孔等大，对光反射迟钝，压眶反射存在，测血压：170/130毫米汞柱。左侧鼻唇沟浅，右口角偏低，舌伸不出，腰穿脑脊液肉眼淡红色，较混浊，化验回报：糖58mg%，氯化物731mg%。诊断：中风，（中脏腑型）。除给予其它药物治疗外，给予鼻饲安宫牛黄丸。由于病

欢 迎 订 阅

《中 医 药 信 息》

雷公藤可致女性卵巢萎缩

山西长治市医学科学研究所 陈宁 冯惠

雷公藤主要用于治疗风湿病类药物。

《本草纲目》中雷公藤主治：杀虫消炎、解毒。雷公藤是一种剧毒药物，对胃肠道有局部刺激作用，对中枢神经系统有损害。

雷公藤一药除以上作用外，笔者发现该药还可抑制女性卵巢。在我国古代就有人作为一种避孕药物。旧社会一些地方妇女也服该药进行节育。

一例 32 岁女性，农民，曾正常生育二胎。六年前患类风湿病，主要服用中草药治疗，其中有雷公藤一药。患病初坚持服药。病情好转后服药时常间断，病重时服，好转停药。连续六年，后因家务事服农药中毒死亡，尸检见：子宫明显小于正常，为 5×2.5 厘米，形状与正常相同，表面光滑、无皱壁，宫颈光滑，无充血、糜烂腺体，血管萎缩。内膜无分泌现象，卵巢较正常细，趋向萎缩，表面有瘢痕，两侧卵巢内卵泡少于正常。与其丈夫了解，死者患病前曾有腰酸、下带多、偶带血丝，有酸味，未经治疗，患风湿病服药后下带明显减少，也无血丝，腰酸等症，月经也由从前正常变为不正常，量少入躁动不安、鼻饲管自行拔出。我们采用了安宫牛黄丸保留灌肠，5天后，病人昏迷程度减轻，十四天后完全清醒。

体会：

灌肠方法简便易操作：通过直肠给药，刺激性小，显效快，药物吸收好，作用强，即避免了对胃肠道刺激症状，减少了由于鼻饲而引起的上消化道出血，也预防了便秘的发生，危险性小，同时减少了病人因插管引起的痛苦，也方便于家庭适用。

色谈。

上述症状与农药中毒无关。笔者认为：系服中药雷公藤长期慢性抑制卵巢所引起。死者曾正常生育二胎，卵巢子宫的萎缩可见是后天性。为此，对小白鼠进行了对比实验，观察发现。服用雷公藤煎汁一组无生育能力，一组大剂量煎汁有中毒死亡现象。

正常的月经周期是依靠卵巢内分泌的调节，卵巢发育中的卵泡分泌雌激素、刺激子宫内膜腺体增生，卵巢内卵泡发育成熟，排卵后形成黄体，分泌黄体素、刺激子宫腺体发生分泌。

由此可见，雷公藤一药长期慢性抑制卵巢引起萎缩，使卵泡不能发育成熟，不能形成黄体，故黄体分泌减少或无，不能致子宫内膜腺体分泌。所以，尸检见子宫内膜无分泌现象。当卵巢抑制，卵泡分泌减少或分泌不成熟卵泡时，雌激素也相应分泌减少，至子宫内膜不规则增殖后逐渐坏死脱落、引起不正常月经。因黄体减少，黄体素也减少，使子宫内膜变薄、血管变细、少，所以月经量减少，色淡，正常月经是依靠卵巢分泌调节，因药物长期慢性抑制引起卵巢萎缩、中期子宫内膜腺体分泌减少，和月经的不规律，量减少，致子宫废用性萎缩。尸检见子宫小于正常。

死者生前白带增多，未经治疗逐渐减少。因子宫分泌和月经量的减少，对宫颈的刺激也相应减少，宫颈的炎性充血，水肿也随着逐渐轻消失。

笔者就患风湿病女性30—45岁之间四人，服中药中有雷公藤者进行走访。患者自服药后有不同程度的月经量和白带量都少于以往，其中一人曾患中度宫颈糜烂，未经治疗，患风湿病服药后一段时间也开始好转。

卵巢的抑制可以引起一系列女性生殖系统功能变化，雷公藤一药可致卵巢萎缩，抑制排卵，达到节育目的，但服药剂量和服药的时间有一定的依赖性。