

中医认为痛经的主要机理在于气血运行不畅,即“不通则痛”,导致气血运行不畅的原因以寒、瘀居多,治疗以通调气血为主,而少腹逐瘀汤集活血化瘀药物及温经散寒药物于一体,既可活血止痛,又可散寒止痛,标本兼顾,是治疗继发性痛经行之有效的方剂,而本组病例以中、重度痛经居多,有效率达 97%,也说明了本方有良好的止痛作用,其作用机理有待于进一步研究和探讨。

收稿日期: 2000-10-08

西黄丸治疗恶性肿瘤应用体会

谭萍

浙江省肿瘤医院 杭州 310022

在治疗各种中晚期恶性肿瘤及恶性肿瘤放、化疗后常产生一些副作用,如肝功能损伤等。西黄丸能治疗各种中晚期恶性肿瘤,尤其适合于食道癌、鼻咽癌、乳癌、肝癌、胆囊癌、胰腺癌、卵巢癌、结肠癌等。亦非常适用于各种癌症病人放、化疗后出现的肝功能损伤及对各种晚期癌症的骨转移有明显的止痛作用。在国内中成药抗癌药物中是一个较理想的好药。我们在临床应用中,广泛使用屡屡奏效,现报道如下。

1 病例资料

例 1 余××,女,48岁,1997年6月7日初诊,鼻咽癌放疗后骨转移。病理类型为鳞状细胞癌。病理号 75002,患者面色黧黑,胸背部疼痛,痛有定处,苔薄黄,脉滑数。经化疗及其他抗癌中成药治疗均无明显效果,需用镇痛剂。加用西黄丸后,患者疼痛锐减,面色转佳。2月个月后复查 ECT,原骨转移灶明显减少,坚持服用西黄丸 2 年至今尚存。

例 2 吴××,女,67岁,胆囊癌肝转移。经 CT 及螺旋 CT 证实。CT 号(81102)。初诊日期 1998 年 5 月 30 日,患者面色萎黄,巩膜轻度黄染,腹部右肋下可及 3cm × 4cm 大小肿块,质硬,腹部叩诊有移动性浊音。已失去手术机会,

放、化疗无效。用中医辨证施治加西黄丸每日 6g 口服,2 周后患者腹痛腹胀减轻,能自由活动,饮食睡眠基本正常,坚持服药至今,追踪观察 1 年,多次复查肿瘤病灶略有缩小。

2 讨论

西黄丸由麝香、牛黄、炙乳香、炙没药组成。方中之牛黄清心、退热、化痰、通窍、散肿结,为主药。辅以麝香芳香辛窜之性,通经络,散结滞,辟恶毒,除秽泄,为辅药。主辅配合,相得益彰,牛黄制麝香辛窜助火之弊,麝香增牛黄化痰散结之功。佐以乳香、没药活血祛瘀,消肿定痛。辅料黄米饭为丸,即可调胃和中,又免诸药攻邪太过而伤脾胃。全方配合,清热解毒,活血祛瘀,消坚肿,可称上品。临床可治疗各种癌症,证见舌红苔腻,脉滑数者均可使用。

动物实验表明西黄丸能抑制小鼠肉瘤 S-180 的生长,对小鼠棱形细胞有明显抑制效果。方中麝香量较大,不但对 HeLa 细胞及腹水癌细胞有较强的杀灭作用,且能增强对肿瘤的免疫功能,破坏癌细胞外围防护因子,有利于机体 NK 细胞对癌细胞有杀灭作用。

收稿日期: 2000-02-14

中药结合手法治疗 椎动脉型颈椎病

应启迩

浙江省鄞县人民医院 鄞县 315040

椎动脉型颈椎病是颈椎病中的一种,临床上较为常见。本病以眩晕为主证,有称颈性眩晕。笔者在 1991~ 1998 年中运用中药内服结合手法治疗 32 例,并随访 1 年以上,疗效满意,报道如下。

1 临床资料

32 例中男 12 例,女 20 例,年龄 28~ 65 岁中,平均年龄 42 岁,病程 5 天~ 14 个月。临床表现及体征:均有眩晕,颈痛,多伴有头痛或偏头痛,恶心,呕吐,或伴耳鸣,听力减退,视物模糊,或伴记忆力减退,健忘失眠等。查体均有颈