

高,病毒随空气传播,当儿童受凉感冒降低了机体低抗力和接触患儿呼吸道分泌物而发病。在人口较密集的地方容易引起小区域内流行,特别是学校的学生,患腮腺炎很多,影响儿童的身体健康,耽误学习。

248例患儿,男148例,女100例;4~7岁198例,8~10岁50例。用鲜蒲公英、蛇莓叶适量捣烂,据年龄大小和肿痛部位大小而定量,青黛10~15g,加白酒适量匀外敷患处,每日1次,待药干后浸少量白酒以保持药物一定湿度,连用3~5天。结果用药3天肿痛消退,体温正常者218例;用药5天临床症状体征消失有30例。上述248例流行腮腺炎患儿(化脓性除外)全部治愈,3天内治愈率达90%。

蒲公英、蛇莓、青黛、白酒用于流行性腮腺炎的药理作用如下:蒲公英为菊科蒲公英属,多年生草本,味苦性寒,具有清热解毒之功,全草入药,用于治疗外科肿毒之症;蛇莓为蔷薇科蛇莓属,多年生矮小草本,味苦寒具有解毒,消散结之功,全草入药,治疗腮腺炎肿痛之症选叶为佳。然而以上两味草药在当地农村山坡、田边、地角均易采集。青黛味咸,具有解毒,散结之功;白酒的主要成份是乙醇,具有较强的挥发性和散发力,几味药混合在一起具有相互协同作用和特殊的药理作用,外用能增强解毒,消肿散结之功效,以达到治愈目的。

头痛速效汤送服马钱蜈蚣胶囊治疗偏头痛 67例

湖南省邵阳学院医院(湖南 422000) 何泽民

目的:观察活血化瘀、行气止痛类中药配伍治疗偏头痛的疗效。方法:将101例偏头痛患者随机分为两组,治疗组67例采取头痛速效汤(川芎、红花、当归、牛膝、细辛、白芷、防风、葛根、延胡、郁金、黄芪、天麻、白芍、甘草)送服马钱蜈蚣胶囊,对照组34例口服西比灵、颅痛定、维生素B₁,都治疗18~30天,观察比较两组综合疗效。结果:治疗组和对照组痊愈分别为46例(68.7%)、18例(52.9%);显效分别为18例、10例,愈显率分别为95.6%、82.3%,两组愈显率经 χ^2 检验,差异具有显著性($P < 0.05$);无效分别为3例、6例;两组头痛完全消失的平均天数分别为 $12.21 \pm 5.60d$ 、 $13.45 \pm 4.70d$,经t检验,差异无显著性($P > 0.05$)。结论:治疗组疗效优于对照组,本疗法具有较好的治疗偏头痛的综合疗效。

安宫牛黄丸治疗高热昏迷临床双盲对照观察

四川省通江中医院(四川 636700) 谢东柏

目的:观察安宫牛黄丸治疗高热昏迷的临床疗效。方法:将住院病人65例随机分成治疗组33例,对照组32例。两组均给予一般治疗、病因治疗等综合治疗措施;治疗组加用安宫牛黄丸(北京同仁堂制药生产)丸剂:3岁以内每次1/4丸,4~6岁每次1/2丸,成人每次1丸,用温开水化开,鼻饲,每天2~3次,连用2~4周。结果:治疗结束统计显示:治疗组显效27例(81.8%),有效5例(15.1%),无效1例(15.1%),总有效率96.9%;对照组显效23例(71.9%),有效2例(6.2%),无效7例(21.9%),总有效率78.1%;两组疗效有显著性差异($P < 0.05$)。治疗组相同疗程内达到体温正常、意识清醒病例比较:0~7天8例(23.63%),7~14天23例(69.69%),14天以上2例(6.89%),治疗组恢复病例比率高于对照组,有显著性差异($P < 0.05$)。结论:安宫牛黄丸治疗高热昏迷可提高有效治疗率。